



Semaglutida

GRUPO TERAPÉUTICO

Análogos del péptido similar al glucagón de tipo 1 (GLP-1)

INDICACIONES APROBADAS EN URUGUAY

Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, junto con tratamiento no farmacológico

DOSIS

Inicial 0,25 mg, aumento de 0,5 mg semanal según respuesta y tolerancia.

Dosis máxima 2 mg semanales

ADMINISTRACIÓN

- Subcutánea (parte frontal del muslo, parte frontal del abdomen o la parte superior del brazo)
- Semanal, preferentemente el mismo día

ALMACENAMIENTO

- Heladera (2-8°), sin congelar
- Proteger de la luz

CONDICIÓN DE VENTA

Bajo receta profesional

Sujeto a farmacovigilancia adicional

EFFECTOS ADVERSOS FRECUENTES**

Hipoglicemia, hiporexia, mareo, complicación de retinopatía diabética, náuseas, vómitos y aumento de enzimas pancreáticas

Ante la aparición de **eventos adversos, notificar a través del siguiente [formulario electrónico](#)

INTERACCIONES

Retrasa el vaciamiento gástrico y por ende puede alterar el efecto de algunos medicamentos como warfarina. Se recomienda un control frecuente del INR al inicio del tratamiento

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes
- Embarazo

RECOMENDACIONES PARA PRESCRIPTORES/AS:

- No utilizar fuera de las indicaciones aprobadas para este medicamento en Uruguay
- Informar al paciente sobre beneficios esperados y riesgos
- Monitorizar la efectividad, seguridad y adherencia al tratamiento

Fuentes de información:

- Centro de información de medicamentos. Ficha técnica Ozempic. España. Consultado octubre 2025. [Acceso](#)
- Ministerio de Salud Pública. Nota de prensa: Información sobre uso y prescripción de Ozempic® (semaglutida). Octubre 2025. [Acceso](#)