

Tabla de referencia de precauciones de aislamiento de microorganismos más frecuentes a nivel hospitalario, según su vía de transmisión, especificando las medidas necesarias en cada caso.

| TABLA DE REFERENCIA DE PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO BASADA EN LA TRANSMISIÓN. Para los siguientes Microorganismos: | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MICROORGANISMO | TIPO DE PRECAUCIÓN | HABITACIÓN INDIVIDUAL | BAÑO exclusivo | Duración de Medidas de Precaución |
| ENTEROBACTERIAS sospechosas o productoras de metalo carbapenemasas y/o NDM,VIM, KPC: E. Coli Klebsiella pneumoniae Citrobacter freundii Proteus Enterobacter u otras | Precauciones de contacto maximizadas | SI | SI | Hasta el Alta |
| PSEUDOMONAS AERUGINOSA O PSEUDOMONAS PUTIDA sospechosa o productora de metalo carbapenemasas y/o VIM | Precauciones de Contacto | boxeado | NO | Hasta el Alta |
| ACINETOBACTER BAUMANNII sospechoso de producir carbapenemasa | Precauciones de Contacto | boxeado | NO | Hasta el Alta |
| ACINETOBACTER BAUMANNII Resistente a colistin | Precauciones de contacto Maximizadas | SI | SI | Hasta el Alta |
| Diarrea con sospecha o confirmación de Clostridioides | Precauciones de Contacto | SI | SI | Hasta finalizar tto y 48 hs sin deposiciones líquidas, bañar y cambiar de unidad. |
| ENTEROCOCO Resistente a Vancomicina | Precauciones de contacto Maximizadas | SI | SI | Hasta el Alta |
| SARS CoV 2 * | Precauciones por Gotitas | SI (con puerta) | NO | No menor a 10 días. En cuadros severos o inmunodeprimidos no menor a 14 días. En todos los casos para levantar precauciones no debe presentar síntomas en las últimas 48 hs |
| BK * | Precauciones Aéreas | SI (con puerta) | NO | Hasta cumplir 2 semanas de tto efectivo |
| SAMR | Precauciones de Contacto | boxeado | NO | Hasta el alta o descolonización |
| HERPES ZOSTER | Precauciones Aéreas y de Contacto | SI (con puerta) | NO | Hasta que todas las lesiones estén en fase costrosa |
| Neisseria Meningitidis** | Precauciones por Gotitas | SI | NO | Hasta 48 horas de iniciado el tratamiento antibiótico |

*En ningún caso los pacientes deben usar tapabocas de alta eficiencia (N95), debe utilizar mascarilla quirúrgica

** Implementar precauciones de aislamiento por Gotitas sólo en casos confirmados de meningoencefalitis o meningocemia